

GIUSEPPE LA GIOIA\*, CRISTIANO LIUZZI\*,  
GIUSEPPE ALBANESE\* & GIUSEPPE NUOVO\*

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PUGLIA, AGGIORNATA AL 2009

**Riassunto** – Viene aggiornato a tutto il 2009 l'elenco degli uccelli segnalati in Puglia appartenenti alle specie attribuite alle Categorie AERC A, B e C. L'elenco è composto da 370 specie, 18 delle quali non presenti nella precedente check-list; le specie accidentali con almeno una osservazione dopo il 1950 sono 64, mentre quelle storiche, non più osservate dopo tale data, sono 24. Le specie nidificanti regolari sono 141, mentre quelle irregolari o accidentali sono 32. Per ogni specie vengono fornite la categoria AERC e la fenologia locale e, per alcune di loro, sono date informazioni in merito alle sottospecie presenti nella regione. Sono riportate anche le specie attribuite alle Categorie D ed E, ma in un elenco distinto.

**Parole chiave** – check-list, uccelli, Puglia.

**Abstract** – *Check-list of the birds of Apulia, updated to 2009.*

The check-list of the birds of Apulia is updated to 2009 and includes species in AERC Categories A, B, C and D. The check-list contains 370 species, 18 of them not reported in the previous one; 64 species are treated as vagrants with at least one record after 1950, while 24 species have not been recorded since. The number of species recorded as regular breeders is 141, while there are 32 irregular or accidental species. For each species, the AERC category and the local phenology are provided and for some of them there is information on the subspecies in the region. We have also reported the species assigned to Categories D and E, but in a separate list.

**Key words** – check-list, birds, Apulia.

### Introduzione

Lo studio dell'avifauna pugliese ha preso origine alla fine del XIX secolo a opera di De Romita e De Ceglie (MOSCHETTI *et alii*, 1996). Sempre in quell'epoca COSTA (1871) e SCARZIA (1893) hanno redatto dei cataloghi per la fauna salentina. Dopo questi lavori si deve aspettare

---

\* Sulle ORME degli ARGONAUTI - Via Cap. Ramirez, 89 - I-73029 Vernole (LE).  
www.ormepuglia.it, www.argonauti.org. E-mail: info@ormepuglia.it

FRUGIS & FRUGIS (1963), Di Carlo e Allavena (MOSCHETTI *et alii* 1996), che negli anni '60-'80 redigono inventari per alcune importanti aree della regione, e MOSCHETTI *et alii* (1996) per la prima check-list "moderna" aggiornata al 1994. Da quella data sono passati ben 15 anni che hanno visto notevoli mutamenti.

In primo luogo, in questi ultimi anni sono stati avviati importanti progetti di monitoraggio su vaste porzioni della regione, come l'IWC per gli uccelli acquatici svernanti, il Progetto Mito2000 per le specie nidificanti comuni e l'Atlante delle specie nidificanti in provincia di Lecce (LA GIOIA, 2009), e studi per l'individuazione, la creazione e la gestione delle aree protette regionali (per es., BELLINI *et alii*, 2008) o inerenti particolari specie di interesse conservazionistico (SIGISMONDI *et alii*, 2003); di pari passo anche l'attività di inanellamento è andata intensificandosi (LA GIOIA & SCEBBA, 2009).

Questi studi hanno contribuito, oltre all'ampliamento delle conoscenze, anche alla formazione di nuovi appassionati e ornitologi locali: si pensi, infatti, che, diversamente da questa, dei tre Autori della prima check-list solo uno era pugliese.

In secondo luogo, il rapido evolversi di mezzi di comunicazione informatici ha permesso una sorprendente proliferazione di strumenti di condivisione e scambio di informazioni e ha stimolato molti semplici appassionati birdwatcher e fotografi naturalistici ad approfondire le loro conoscenze. La principale rete di connessione per l'osservazione degli uccelli in Puglia è riconducibile al gruppo di discussione e al forum "Argonauti" ([www.argonauti.org](http://www.argonauti.org)).

Contestualmente il sistema di categorizzazione delle specie ornitiche ufficialmente raccomandato dall'AERC (Association of European Records and Rarities Committees) e, successivamente, ripreso e arricchito nell'ultima check-list nazionale è differente da quello usato nella precedente check-list regionale (AERC TAC, 2003; FRACASSO *et alii*, 2009). La check-list nazionale, in particolare, recepisce alcune variazioni sistematiche, propone variazioni ad alcuni nomi comuni e cataloga le specie italiane, oltre che in base alla presenza (attuale o storica), anche in relazione allo "status generale" e allo "status di nidificante" con un particolare riferimento al decennio precedente. Appare quindi ovvio che si sia sentita l'esigenza di aggiornare la check-list regionale, vecchia di 15 anni.

Poiché, come si è detto, un discreto numero di informazioni è scaturito dal mondo dei birdwatcher, si è preferito affiancare al nuovo sistema di classificazione anche quello tradizionale, che fornisce informazioni in merito ai periodi dell'anno in cui è possibile osservare le specie elencate e che, pertanto, può favorire un utile sussidio per il riconoscimento indiretto delle specie avvistate e per la comprensione della fenologia delle stesse.

### Materiali e metodi

Il lavoro di catalogazione proposto integra la check-list di MOSCHETTI *et alii* (1996) con dati scaturiti dall'analisi della letteratura scientifica prodotta successivamente alla stesura della stessa e ricavata anche attraverso la consultazione della *Banca Dati Ornitologica* (BRICHETTI, 2005) aggiornata al 2007, dalla consultazione dei volumi 1-6 di *Ornitologia italiana* (BRICHETTI & FRACASSO, 2003-2010), da dati scaturiti dalle segnalazioni riportate nei gruppi di discussione EBN Italia e Argonauti e dei relativi annuari, oltre che con dati personali o riferiti verbalmente dai singoli rilevatori.

La nomenclatura e la sistematica utilizzate ricalcano quelle della recente Check-list CISO-COI degli Uccelli italiani, così come le categorie AERC, lo *status* generale e quello riproduttivo (FRACASSO *et alii*, 2009):

**Categorie AERC** (lettera/e) che descrivono sinteticamente lo *status* di una specie in un territorio (AERC TAC, 2003):

- A** = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1950;
- B** = specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta tra il 1800 e 1949;
- C** = specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività, che ha formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi; la categoria C vale anche per individui giunti spontaneamente da popolazioni aventi le medesime caratteristiche, insediate al di fuori della Puglia;
- D** = specie di origine selvatica possibile, ma non certa, oppure specie che, per qualche motivo, non può essere inserita in una delle altre categorie (non comprende: casi di incertezza tra C ed E, tutti attribuiti ad E);
- E** = specie introdotta o sfuggita alla cattività, priva dei requisiti previsti per la categoria C; sono state escluse le specie avvistate solo in un'occasione per ciascuna località di osservazione, considerando solo le specie i cui esemplari sono stati avvistati in ambiente naturale per un congruo lasso di tempo.

Come suggerito dall'AERC, solo per un numero limitato di casi a una specie sono state attribuite due categorie e le specie attribuite alle categorie D ed E sono state inserite in elenchi distinti.

**Status generale** (prima cifra che segue la categoria AERC):

- 1** = regolare: specie constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni;
- 2** = irregolare: specie constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni;
- 3** = accidentale: specie constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il 1950;
- 4** = storica: specie constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.

**Status riproduttivo** (seconda cifra che segue la categoria AERC):

- 1** = regolare: specie che ha nidificato in almeno 9 degli ultimi 10 anni;
- 2** = irregolare: specie che ha nidificato in 1-8 anni degli ultimi 10, ma in più di 3 siti o anni; anche specie che non ha nidificato negli ultimi 10 anni, ma ha nidificato in più di 3 siti o anni nel periodo precedente (mai però regolarmente);
- 3** = accidentale: specie che ha nidificato solo in 1-3 siti o anni;
- 4** = storica: specie che ha nidificato regolarmente in un certo periodo, ma mai negli ultimi 10 anni;
- 0** = specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

Per fornire maggiori indicazioni sulla presenza delle specie in Puglia nell'arco dell'anno, come in altre recenti check-list regionali (LAURENTI & PACI, 2006; PAVIA & BOANO, 2009), sono state utilizzate anche le categorie fenologiche ricavate da BRICHETTI & MASSA (1998), con l'eccezione della categoria (A) che è stata utilizzata secondo quanto riportato da MOSCHETTI *et alii* (1996) e con l'aggiunta della categoria E tratta da questo ultimo lavoro e della W irr che sostituisce la categoria (W) di MOSCHETTI *et alii* (1996). Nel dettaglio sono state utilizzate le seguenti categorie:

- B** = nidificante (breeding): viene sempre indicata anche se la specie è sedentaria; per i nidificanti irregolari, quando possibile, viene fornita un'indicazione degli anni in cui è avvenuta la nidificazione;
- E** = estivante (non breeding summer visitor): presente nel periodo riproduttivo della specie senza però nidificare;
- S** = sedentaria o stazionaria (sedentary, resident): viene sempre abbinato a "B";
- M** = migratrice (migratory, migrant): sono incluse anche le specie che compiono dispersioni ed erratismi;
- W** = svernante (wintering, winter visitor): presente fra l'1 dicembre ed il 15 febbraio;
- A** = accidentale (vagrant, accidental): specie con non più di dieci segnalazioni (e non individui) o più di dieci, ma in meno di 6 anni dopo il 1950; in questa categoria sono state inserite le specie che non sono state mai osservate dopo il 1994 e che erano riportate con la stessa categoria nella precedente check-list e quelle che erano riportate come irregolari per la regione, ma di cui non si conoscono più di 5 segnalazioni dopo il 1950; questo simbolo viene affiancato dal numero di segnalazioni se inferiore o uguale a 10, corredate dalla provincia (utilizzata la suddivisione amministrativa in 5 province, anche se dal 2009 ne è stata istituita una sesta tra Bari e Foggia) e dall'anno in cui sono state effettuate le osservazioni successive al 1949, quando note.

**(A)**= Accidentale storico: accidentale osservato solo prima del 1950.

Quando per una stessa specie si è reso necessario impiegare più simboli, questi sono stati usati in ordine di importanza.

Queste categorie sono state meglio definite tramite l'uso di ulteriori classi definite dalla seguenti abbreviazioni:

**reg** = regolare (regular): viene abbinato solo a "M" per le specie rilevate in almeno 9 degli ultimi 10 anni.

**irr** = irregolare (irregular): abbinato sia a "M" sia a "B" in accordo con quanto riportato nelle rispettive categorie dello status generale e di quello riproduttivo sopra descritte.

**acc** = accidentale (accidental): viene abbinato solo con "B" per indicare un numero di nidificazioni accertate non superiore a 1-3 siti o anni.

**par** = parziale o parzialmente (partial, partially): viene abbinato a "SB" per indicare specie con popolazioni sedentarie e migratrici; abbinato a "W" indica che lo svernamento riguarda solo una parte della popolazione migratrice.

**?** = può seguire ogni simbolo e significa dubbio.

Per alcune specie si è resa necessaria una piccola nota di commento, richiamata da un numero nella check-list.

## LISTA A-C

### ANSERIFORMI

#### Anatidi

1	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	W irr, M irr	A20	
2	Cigno minore	<i>Cygnus columbianus</i>	A-3 [LE 1984, 1992]	A30	
3	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A-8 [LE 1986, 1998; BR 1997]	A30	
4	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	M irr, W irr	A20	
5	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	M irr, W irr	A20	
6	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	A-10 [BR 1992, 1993, 1994]	A30	
7	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	M reg, W, SB (dal 2003)	A12	
8	Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	(A-1)	B40	1
9	Oca coloraccio	<i>Branta bernicla</i>	(A-1)	B40	
10	Oca colombo	<i>Branta ruficollis</i>	A-3 [FG 1950, 1997]	A30	
11	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	W irr, M irr, E irr	A20	
12	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	M reg, W, B	A11	
13	Fischione	<i>Anas penelope</i>	M reg, W, E irr, B acc [FG 1994 o 1995]	A13	
14	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	M reg, W, E, B acc ?	A13?	2
15	Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	(A-1)	B40	
16	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	M reg, W, E, B irr	A12	
17	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	M reg, W, SB	A11	
18	Codone	<i>Anas acuta</i>	M reg, W, E irr, B acc [FG anni '60 - '70]	A13	
19	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	M reg, B irr	A12	
20	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	M reg, W, B acc [FG anni '80; LE 1982]	A13	
21	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	A-4 (FG 2005, 2009)	A30	
22	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	M irr, W irr, E irr, B acc [LE 2005 e 2009]	A23	
23	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	M reg, W, E, B irr	A12	
24	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	M reg, W, B, E	A11	

25	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	M reg, W, B irr	A12	3
26	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	W irr	A20	
27	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	M irr, W irr	A20	
28	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	A-4 [FG 2007]	A30	
29	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	M irr, W irr	A20	
30	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	A-8 [FG 2000, 2002, 2003, 2005; BA 2008]	A30	
31	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	M reg, W	A10	
32	Pesciaiola	<i>Mergellus albellus</i>	W irr	A20	
33	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	M reg, W	A10	4
34	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	A	A30	5
35	Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	A, B estinto	A34	

**GALLIFORMI****Fasianidi**

36	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	(A)	B40	
37	Starna	<i>Perdix perdix</i>	introdotta, SB estinta	A24/E	
38	Quaglia comune	<i>Coturnix coturnix</i>	M reg, B, W par	A11	
39	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	SB	C11	

**GAVIFORMI****Gavidi**

40	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	W irr	A20	
41	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	W, M irr	A10	6
42	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	(A-1)	B40	

**PROCELLARIFORMI****Procellaridi**

43	Ossifraga	<i>Macronectes giganteus</i>	A-1 [Mare Adriatico, 1991]	A30	
44	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	SB par, M reg	A11	
45	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	SB par, M reg	A11	

**Idrobatidi**

46	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	M irr	A20	5
----	------------------------	-----------------------------	-------	-----	---

**PELECANIFORMI****Sulidi**

47	Sula	<i>Morus bassanus</i>	M reg, W	A10	
----	------	-----------------------	----------	-----	--

**Pelecanidi**

48	Pellicano comune	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	A-10 [BA 1993; LE 1996, 1998, 2000; 2008; FG 2002, 2004; LE-BR2009]	A30	
49	Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	A-1 [TA 2002]	A30	
50	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	A-1 [LE 1955]	A30	

**Falacrocoracidi**

51	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	M reg, W, B (dal 2002), E	A12	
52	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	M irr	A20	7
53	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmaeus</i>	SB (dal 2006), W, E irr	A12	

**CICONIFORMI****Ardeidi**

54	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	M reg, W, B	A11	
55	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	M reg, B	A11	
56	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	M reg, B, W irr	A11	

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PUGLIA, AGGIORNATA AL 2009

57	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	M reg, B, W irr	A11	
58	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	W irr, Mig irr, E irr	A10	
59	Airone schiacciato	<i>Egretta gularis</i>	A-2 [FG 1990; TA 2002]	A30	
60	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	M reg, W, B, E	A11	
61	Airone bianco maggiore	<i>Casmerodius albus</i>	M reg, W, E irr	A10	
62	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	M reg, W, E	A10	
63	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	M reg, B	A11	
<b>Ciconidi</b>					
64	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	M reg, E irr	A10	
65	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	M reg, B (1999 e dal 2002), W irr	A12/C	
<b>Treschiornitidi</b>					
66	Mignattaiolo	<i>Plegadis falcinellus</i>	M reg, E irr, W irr, B irr	A12	8
67	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	M reg, E, W	A10	
<b>FENICOPTERIFORMI</b>					
<b>Fenicopteridi</b>					
68	Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	SB par (dal 1996), M reg, W, E	A11	
<b>PODICIPEDIFORMI</b>					
<b>Podicipedidi</b>					
69	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	M reg, W, SB	A11	
70	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	M reg, W, SB	A11	
71	Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	W irr	A20	
72	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	A-7 [FG 2006, 2009; TA 2008; BA 2008, 2009]	A30	
73	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	M reg, W, B acc	A13	
<b>FALCONIFORMI</b>					
<b>Accipitridi</b>					
74	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	M reg, B, W irr	A11	9
75	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	M reg, B	A11	
76	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	SB, M reg, W	A11	
77	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	(A-2)	B40	10
78	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	M reg, B irr	A12	
79	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A-5 [FG 1950?, 2003; TA 1994; BA 2001]	A30/C	11
80	Biancone	<i>Circaetus gallicus</i>	M reg, B, W irr	A11	
81	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	M reg, W, E	A10	
82	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	M reg, W	A10	
83	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	M reg, W irr	A10	
84	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	M reg, B estinto	A14	
85	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	M irr, B acc ?	A23?	2
86	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	M reg, W, SB	A11	
87	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	SB, W, M reg	A11	12
88	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	M reg, W irr	A10	
89	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A-4 [FG 1987]	A30	
90	Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A-4 [FG 1970, 2004, 2005]	A30	
91	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	M irr	A20	
92	Aquila minore	<i>Aquila pennata</i>	M reg, W, E irr	A10	
93	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	A-3 [BA 2000, 2003]	A30	
94	Aquila di Bonelli	<i>Aquila fasciata</i>	A-3 [BR 1958?], B estinto ?	A34?	13
95	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	A-2 [BA 1989; FG 1990]	A30	

<b>Pandionidi</b>				
96	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	M reg, W, E irr, B estinto	A14
<b>Falconidi</b>				
97	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	M reg, B, W irr	A11
98	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	SB, M reg, W	A11
99	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	M reg	A10
100	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	M reg, W	A10
101	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	M reg, B	A11
102	Falco della Regina	<i>Falco eleonorae</i>	M reg, B estinto ?	A14
103	Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	SB	A11
104	Sacro	<i>Falco cherrug</i>	M reg, W irr	A10
105	Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	SB, M reg, W	A11 14
106	Falcone della Barberia	<i>Falco pelegrinoides</i>	(A-1)	B40
<b>GRUIFORMI</b>				
<b>Rallidi</b>				
107	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	M reg, W, SB	A11
108	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	M reg, B acc [FG 1990]	A13
109	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	M reg	A10
110	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	M irr	A20 5
111	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	M reg	A10
112	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	SB, M reg, W	A11
113	Pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>	SB estinto	B44
114	Folaga	<i>Fulica atra</i>	M reg, W, SB	A11
<b>Gruidi</b>				
115	Gru	<i>Grus grus</i>	M reg, W irr, E irr	A10
<b>Otididi</b>				
116	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	SB (estinta?)	A24? 15
117	Ubara asiatica	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	(A-1)	B40 16
118	Otarda	<i>Otis tarda</i>	A-10	A30 17
<b>CARADRIFORMI</b>				
<b>Ematopodidi</b>				
119	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	M reg, E irr	A10
<b>Recurvirostridi</b>				
120	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	M reg, B, W irr	A11
121	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	M reg, B, W	A11
<b>Burinidi</b>				
122	Occhione	<i>Burhinus oedichnemus</i>	M reg, B, W irr	A11
<b>Glareolidi</b>				
123	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	(A-5)	B40
124	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	M reg, B irr	A12
125	Pernice di mare orientale	<i>Glareola nordmanni</i>	(A-1)	B40
<b>Charadriidi</b>				
126	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	M reg, B, W irr, E irr	A11
127	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	M reg, W, E irr	A10
128	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	M reg, W, SB	A11
129	Corriere asiatico	<i>Charadrius asiaticus</i>	(A-1)	B40
130	Piviere tortolino	<i>Charadrius morinellus</i>	M reg	A10

## CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PUGLIA, AGGIORNATA AL 2009

131	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	M reg, W	A10	
132	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	M reg, W, E irr	A10	
133	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregarius</i>	A-6 [FG 1970, 1995]	A30	18
134	Pavoncella codabianca	<i>Vanellus leucurus</i>	A-1 [FG 1995]	A30	
135	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	W, M reg, B estinta	A14	
<b>Scolapacidi</b>					
136	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	M reg, W	A10	
137	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	M reg, W	A10	
138	Gambecchio comune	<i>Calidris minuta</i>	M reg, W, E	A10	
139	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	M reg, W irr	A10	
140	Piovanello comune	<i>Calidris ferruginea</i>	M reg, W irr, E irr	A10	
141	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	A	A30	5
142	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	M reg, W	A10	
143	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	M irr	A20	
144	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	A-1 [LE 1982]	A30	
145	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	M reg, W, E	A10	
146	Frullino	<i>Lymnocyptes minimus</i>	M reg, W irr	A10	
147	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	M reg, W	A10	
148	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	M reg	A10	
149	Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	M reg, W	A10	
150	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	M reg, W, E	A10	
151	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	M reg, W irr	A10	
152	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	M reg, W irr, E irr	A10	
153	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	estinto?	A30	19
154	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	M reg, W, E	A10	
155	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	A-7 [FG 1969, 2001; BA 1984; LE 2003]	A30	
156	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	M reg, E, W, B acc	A13	20
157	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	M reg, W irr, E irr	A10	
158	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	M reg, W, E	A10	
159	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	M reg, W, E irr	A10	
160	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	M reg, E irr, W irr	A10	
161	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	M reg, E irr, W irr	A10	
162	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	M reg, W, E, B	A11	
163	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	M reg, W, E irr	A10	
164	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	M reg, W irr, E irr	A10	
165	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	A-2 [BA 2008]	A30	
<b>Stercoraridi</b>					
166	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A-5 [FG 1970; BA 1983]	A30	
167	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A-10 [FG 1972, 1976; LE 1994, 2004, 2005, 2009, 2009; BA 2007]	A30	
168	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A-2 [FG 1969]	A30	
169	Stercorario maggiore	<i>Stercorarius skua</i>	A-1 [BA 1986]	A30	
<b>Laridi</b>					
170	Gabbiano di Sabine	<i>Xema sabini</i>	A-1 [BA 2007]	A30	
171	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	M reg, W irr, E irr	A10	
172	Gabbiano roseo	<i>Chroicocephalus genei</i>	M reg, B (dal 1988), W	A11	
173	Gabbiano comune	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	M reg, W, B acc [FG 1994]	A13	
174	Gabbianello	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	M reg, W, E irr	A10	
175	Gabbiano di Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	A-1 [BA 2004]	A30	
176	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	M reg, W, E, B (dal 1993)	A11	
177	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	SB (dal 1992) par, M reg	A11	

178	Gavina	<i>Larus canus</i>	M reg, W	A10	
179	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	M reg, W, E irr	A10	21
180	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	W, M reg	A10	
181	Gabbiano reale	<i>Larus michahellis</i>	M reg, W, SB, E	A11	
182	Gabbiano reale pontico	<i>Larus cachinnans</i>	M reg, W	A10	
183	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A-7 [FG 2003; BR 2004; BA 2004, 2006, 2007, 2007, 2008]	A30	
<b>Sternidi</b>					
184	Fraticello	<i>Sternula albifrons</i>	M reg, B, W irr	A11	
185	Sterna zamperere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	M reg, B, W irr	A11	
186	Sterna maggiore	<i>Hydroprogne caspia</i>	M reg	A10	
187	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	M reg, E irr	A10	
188	Mignattino comune	<i>Chlidonias niger</i>	M reg, E irr	A10	
189	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucopterus</i>	M reg	A10	
190	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	M reg, W, B irr	A12	
191	Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis</i>	A-1 [BA 2002]	A30	
192	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	M reg, B irr, E irr	A12	
<b>Alcidi</b>					
193	Uria	<i>Uria aalge</i>	(A-1)	B40	
194	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	A [BA1999]	A30	
195	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	(A)	B40	
<b>PTEROCLIFORMI</b>					
<b>Pterocliidi</b>					
196	Sirratte	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	(A-1)	B40	
<b>COLUMBIFORMI</b>					
<b>Columbidi</b>					
197	Piccione selvatico	<i>Columba livia</i>	SB	A11/C	
198	Colombella	<i>Columba oenas</i>	M irr, W irr, B estinta ?	A24?	22
199	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	M reg, W, SB	A11	
200	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	SB	A11	
201	Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	M reg, B	A11	23
<b>PSITTACIFORMI</b>					
<b>Psittacidi</b>					
202	Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	SB naturalizzata	C11	
<b>CUCULIFORMI</b>					
<b>Cuculidi</b>					
203	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	M reg, B irr [LE 1989, 2004, 2007, 2007; TA 2001; BA 2006]	A12	
204	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	M reg, B	A11	
<b>STRIGIFORMI</b>					
<b>Titonidi</b>					
205	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	SB, M reg	A11	
<b>Strigidi</b>					
206	Assiolo	<i>Otus scops</i>	M reg, B, W irr	A11	
207	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	SB	A12	24
208	Civetta	<i>Athene noctua</i>	SB	A11	
209	Allocco	<i>Strix aluco</i>	SB	A11	
210	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	SB, M reg, W	A11	
211	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	M reg, W irr	A10	

**CAPRIMULGIFORMI****Caprimulgidi**

212	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	M reg, B	A11
-----	-------------	------------------------------	----------	-----

**APODIFORMI****Apodidi**

213	Rondone comune	<i>Apus apus</i>	M reg, B, W irr	A11
214	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	M reg, B	A11
215	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	M reg, B	A11

**CORACIFORMI****Alcedinidi**

216	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	M reg, W, SB	A11
-----	------------------	----------------------	--------------	-----

**Meropidi**

217	Gruccione egiziano	<i>Merops persicus</i>	A-2 [LE 1998]	A30
218	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	M reg, B	A11

**Coracidi**

219	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	M reg, B	A11
-----	------------------	--------------------------	----------	-----

**Upupidi**

220	Upupa	<i>Upupa epops</i>	M reg, B, W irr	A11
-----	-------	--------------------	-----------------	-----

**PICIFORMI****Picidi**

221	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	M reg, B, W parz	A11	25
222	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	SB	A11	
223	Picchio nero	<i>Dryocopus martius</i>	SB estinto	B44	
224	Picchio rosso maggiore	<i>Dendrocopos major</i>	SB	A11	
225	Picchio rosso mezzano	<i>Dendrocopos medius</i>	SB	A11	
226	Picchio dalmatino	<i>Dendrocopos leucotos</i>	SB?	A—	26
227	Picchio rosso minore	<i>Dendrocopos minor</i>	SB	A11	

**PASSERIFORMI****Alaudidi**

228	Allodola di Dupont	<i>Chersophilus duponti</i>	A-1 [FG 1962]	A30
229	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	SB	A11
230	Calandra siberiana	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	A-1 [FG 1957]	A30
231	Calandra nera	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	A-1 [FG 1961]	A30
232	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	M reg, B, W irr	A11
233	Calandrina	<i>Calandrella rufescens</i>	A-2 [LE1972]	A30
234	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	SB	A11
235	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	SB, M reg, W parz	A11
236	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	M reg, W, SB	A11
237	Allodola golagialla	<i>Eremophila alpestris</i>	A-2 [FG 1994]	A30

**Irundinidi**

238	Topino	<i>Riparia riparia</i>	M reg, B irr	A12
239	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	SB (almeno dal 2004)	A11
240	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	M reg, B, W irr	A11
241	Balestruccio	<i>Delichon urbicum</i>	M reg, B, W irr	A11
242	Rondine rossiccia	<i>Cecropis daurica</i>	M reg, B	A11

**Motacillidi**

243	Calandro maggiore	<i>Anthus richardi</i>	M irr, W irr	A20
-----	-------------------	------------------------	--------------	-----

244	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	M reg, B	A11	
245	Prispolone indiano	<i>Anthus hodgsoni</i>	A-1 [LE2002]	A30	
246	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	M reg, B acc [FG inizio anni '80]	A13	
247	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	M reg, W	A10	
248	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	M reg, W irr	A10	
249	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	M reg, W	A10	
250	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>	A-1 [BA 2008]	A30	
251	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	M reg, B, W irr	A11	27
252	Cutrettola testagiella orientale	<i>Motacilla citreola</i>	A-1 [BA 2006]	A30	
253	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	W, M reg, SB	A11	
254	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	W, M reg, SB	A11	28
<b>Bombicillidi</b>					
255	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	A	A30	5
<b>Cinclidi</b>					
256	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	(A-3)	B40	
<b>Trogloditidi</b>					
257	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	M reg, W, SB	A11	
<b>Prunellidi</b>					
258	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	M reg, W	A10	
259	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	A-4 [FG 1976, 1990; BA 1989; LE 1995]	A30	
<b>Turdidi</b>					
260	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	M reg, W, SB	A11	
261	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	M reg, B	A11	
262	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	M reg	A10	
263	Codiroso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	M reg, W, B	A11	
264	Codiroso comune	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	M reg, B	A11	
265	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	M reg	A10	
266	Saltimpalo	<i>Saxicola torquatus</i>	M reg, W, SB	A11	
267	Culbiano isabellino	<i>Oenanthe isabellina</i>	A-6 [FG 1976, 1977, 1982, 2008; LE 2002, 2006]	A30	
268	Culbiano	<i>Oenanthe oenanthe</i>	M reg, B	A11	
269	Monachella dorsonero	<i>Oenanthe pleschanka</i>	A-1 [FG 1977]	A30	29
270	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	M reg, B	A11	30
271	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	M reg, B acc	A13	31
272	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	M reg, W, SB	A11	
273	Tordo dorato	<i>Zoothera dauma</i>	(A-1)	B40	
274	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	M reg	A10	
275	Merlo	<i>Turdus merula</i>	M reg, W, SB	A11	
276	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	A-1 [LE 1995]	A30	
277	Tordo golanera	<i>Turdus atrogularis</i>	A-1 [LE 2000]	A30	
278	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	M reg, W	A10	
279	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	M reg, W, SB	A11	
280	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	M reg, W	A10	
281	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	SB, W	A11	
<b>Silvidi</b>					
282	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	SB	A11	
283	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	SB	A11	
284	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	A	A30	
285	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	M reg	A10	32
286	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	M reg, W, B	A11	

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DELLA PUGLIA, AGGIORNATA AL 2009

287	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	M irr	A20	5
288	Forapaglie comune	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	M reg	A10	
289	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	M reg	A10	
290	Cannaiola comune	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	M reg, B	A11	
291	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	M reg, B	A11	
292	Canapino pallido	<i>Hippolais pallida</i>	A-2 [TA 1965; LE 2005]	A30	33
293	Canapino levantino	<i>Hippolais olivetorum</i>	(A-1)	B40	
294	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	M reg	A10	
295	Canapino comune	<i>Hippolais polyglotta</i>	M reg, B acc	A13	20
296	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	M reg, W, SB	A11	
297	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	M reg, B acc	A13	
298	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	M reg	A10	
299	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	M reg, B irr	A13	34
300	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	M reg, B	A11	
301	Sterpazzola della Sardegna	<i>Sylvia conspicillata</i>	M reg, B	A11	
302	Magnanina comune	<i>Sylvia undata</i>	SB	A11	35
303	Bigia di Rüppell	<i>Sylvia rueppelli</i>	A-5 [LE 1955, 2005, 2007; FG 1989]	A30	
304	Sterpazzolina comune	<i>Sylvia cantillans</i>	M reg, B	A11	36
305	Sterpazzolina di Moltoni	<i>Sylvia subalpina</i>	M reg	A10	
306	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	SB, W, M reg	A11	
307	Lù di Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	A-2 [LE 2002, 2002]	A30	
308	Lù bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	M reg, B acc	A12	
309	Lù verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	M reg, B irr	A12	
310	Lù piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	M reg, W, B	A11	37
311	Lù grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	M reg	A10	
312	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	M reg, W, B?	A10	
313	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapilla</i>	M reg, W, SB	A11	
<b>Muscicapidi</b>					
314	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	M reg, B	A11	
315	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	A-3 [LE 2002, TA 2005, BA 2009]	A30	
316	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	M reg, B	A11	
317	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	M reg	A10	
<b>Timalidi</b>					
318	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	SB, M irr, W irr	A11	
<b>Egitalidi</b>					
319	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	SB	A11	
<b>Paridi</b>					
320	Cinciarella	<i>Cyanistes caeruleus</i>	SB, M reg, W	A11	
321	Cincialegra	<i>Parus major</i>	SB, M irr, W irr	A11	
322	Cincia mora	<i>Periparus ater</i>	SB	A11	
323	Cincia bigia	<i>Poecile palustris</i>	SB	A11	
<b>Sittidi</b>					
324	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	SB	A11	
<b>Ticodromidi</b>					
325	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	A-10 [FG 1987, 1991, 1992, 1993, 2003, 2008; TA1989, 1991]	A30	38
<b>Cerzidi</b>					
326	Rampichino comune	<i>Certhia brachydactyla</i>	SB	A11	

	<b>Remizidi</b>				
327	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	SB, M reg, W	A11	
	<b>Oriolidi</b>				
328	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	M reg, B	A11	
	<b>Lanidi</b>				
329	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	M reg, B	A11	39
330	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	M reg, B	A11	
331	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	A-4 [BA 2006, 2009; FG 2009; LE 2009]	A30	40
332	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	M reg, B	A11	41
	<b>Corvidi</b>				
333	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	SB	A11	
334	Gazza	<i>Pica pica</i>	SB	A11	
335	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	(A-1)	B40	
336	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	SB	A11	
337	Corvo comune	<i>Corvus frugilegus</i>	M irr	A20	42
338	Cornacchia grigia	<i>Corvus cornix</i>	SB	A11	
339	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	SB	A11	
	<b>Sturnidi</b>				
340	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	M reg, W, SB	A11	
341	Storno roseo	<i>Pastor roseus</i>	A	A30	43
	<b>Passeridi</b>				
342	Passera europea	<i>Passer domesticus</i>	SB	A11	44
343	Passera sarda	<i>Passer hispaniolensis</i>	SB, M reg, W	A11	
344	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	SB	A11	
345	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	SB	A11	
346	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A-1 [FG 2008]	A30	
	<b>Fringillidi</b>				
347	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	M reg, W, SB	A11	
348	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	M reg, W irr	A10	
349	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	SB, W, M reg	A11	
350	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	SB, W, M reg	A11	
351	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	SB, W, M reg	A11	
352	Lucherino	<i>Carduelis spinus</i>	M reg, W, B acc	A13	45
353	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	M reg, W, SB	A11	
354	Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	(A)	B40	
355	Crociere	<i>Loxia curvirostra</i>	M irr, W irr, B acc [LE 1983 e 1990]	A13	
356	Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	(A-1)	B40	
357	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	(A-9)	B40	
358	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	M irr, W irr	A11	
359	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	M reg, W, SB	A11	
	<b>Emberizidi</b>				
360	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	W	A10	
361	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A-3 [LE2003]	A30	
362	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	M irr, W irr	A20	
363	Zigolo nero	<i>Emberiza cirlus</i>	M reg, W, SB	A11	
364	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	M reg, W, SB	A11	
365	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	M irr	A20	
366	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	A-4 [LE2004]	A30	
367	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	(A-3)	B40	
368	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	M reg, W, SB	A11	
369	Zigolo capinero	<i>Emberiza melanocephala</i>	M reg, B	A11	
370	Strillozzo	<i>Emberiza calandra</i>	SB, M reg, W	A11	

## NOTE

- 1 alcune segnalazioni recenti attribuibili ad individui fuggiti dalla cattività
- 2 segnalata come probabile nidificante negli anni '70 ed '80
- 3 nessuna segnalazione di nidificazione dopo il 1994
- 4 una segnalazione estiva: LE 2007
- 5 nessuna segnalazione dopo il 1994
- 6 un ritrovamento di un esemplare in difficoltà in luglio: LE 2007
- 7 una segnalazione dopo il 1994: BA 2004
- 8 ultima nidificazione FG 1994
- 9 quattro segnalazioni invernali: LE 2002, BR 2008, BA 2008, BA 2008
- 10 il COSTA (1871) e lo SCARZIA (1893) la riportano rara senza specificarne l'effettiva consistenza
- 11 una segnalazione non considerata perché frutto di un recente rilascio a scopo di reintroduzione in Basilicata: TA 2003
- 12 *Buteo b. buteo*: SB, W, M reg; *B. b. vulpinus*: M reg
- 13 nidificazione storica solo presunta e mai accertata
- 14 *Falco p. brookei*: SB, M reg, W; *F. p. peregrinus* e *F. p. calidus*: M reg, W
- 15 SIGISMONDI *et alii* (2003) riportano ancora la presenza di una piccola popolazione; Cripezzi (*ex verbis*) ne segnala la progressiva rarefazione
- 16 specie revisionata, prima considerata Ubara africana, *Chlamydotis undulata*
- 17 ultima segnalazione FG 1970
- 18 specie precedentemente riportata erroneamente come *Chettusia leucura*
- 19 ultima segnalazione FG 1995
- 20 ultime nidificazioni nel periodo 1983-86
- 21 *Larus f. intermedius* e *graellsii* M reg, W, E irr; *L. f. fuscus*: M irr, W irr; *L. f. heuglinii*: A-2 [BA 2007 e 2007]
- 22 nessuna segnalazione di nidificazione dopo gli anni '80
- 23 una segnalazione invernale: LE 2006; una seconda invernale, BA 2008, si riferisce ad un esemplare con difficoltà di volo
- 24 non esistono prove certe di nidificazioni recenti
- 25 *Jynx t. tschusii*: M reg, B, W par; *J. t. torquilla*: M reg
- 26 segnalazioni sporadiche, nidificazione mai accertata, assenza di dati certi per scarsità di indagini
- 27 *Motacilla f. cinereocapilla* e *feldegg*: M reg, B; *M. f. flava*, *beema*, *iberiae*, *superciliaris* e *thunbergi*: M reg
- 28 *Motacilla a. yarrellii*: A
- 29 una segnalazione TA 1992 da confermare
- 30 *Oenanthe h. melanoleuca*: M reg, B; *O. h. hispanica*: M reg
- 31 alcune segnalazioni di nidificazione fino agli anni '80
- 32 segnalazione di nidificazione da confermare
- 33 *Hippolais p. opaca*: TA 1965; *H. p. elaeica*: LE 2005
- 34 ultime nidificazioni negli anni '60; *Sylvia h. crassirostris* A1 [BA2007]
- 35 sebbene questa specie sia stata accertata nidificante in meno di 9 anni negli ultimi 10, si ritiene che ciò sia dovuto esclusivamente alla mancanza di censimento nei luoghi idonei per questa specie molto localizzata
- 36 *Sylvia c. cantillans*: M reg, B; *S. c. albistriata*: M reg, B?
- 37 *Phylloscopus c. collybita*: M reg, W, B; *P. c. abietinus*: M reg, W; *P. c. tristis*: A-2 [BA 2007 e 2007]
- 38 probabilmente più comune
- 39 una segnalazione invernale si riferisce ad un esemplare con un'ala non perfettamente normale: BA 2007
- 40 ritenute valide solo le segnalazioni certamente attribuibili a questa specie, in attesa di valutazione di quelle più datate (FG 1897, 1960, 1981; TA 1898, BA 1988), che potrebbero essere attribuite anche all'Averla meridionale, *Lanius meridionalis*, anche perché

sia il COSTA (1871) sia lo SCARZIA (1893) riportano questa specie, sebbene rara, per la fauna salentina.

- 41 *Lanius. s. senator*: M reg, B; *L. s. badius*: M irr  
 42 due segnalazioni dopo il 1994: FG 2005, 2005  
 43 una segnalazione dopo il 1994: LE 2002  
 44 *Passer d. italiae*: SB; *P. d. domesticus*: A-1 [FG 2008]  
 45 nessuna segnalazione di nidificazione dopo gli anni '80

## **LISTA E**

<b>Anatidi</b>			
1	Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	
2	Dendrocigna vagabonda	<i>Dendrocygna arcuata</i>	
3	Anatra muta	<i>Cairina moschata</i>	
4	Anatra sposa	<i>Aix sponsa</i>	
5	Alzavola anellata	<i>Callonetta leucophrys</i>	
<b>Fasianidi</b>			
6	Quaglia giapponese	<i>Coturnix japonica</i>	1
<b>Fenicopteridi</b>			
7	Fenicottero minore	<i>Phoenicopterus minor</i>	
<b>Psittacidi</b>			
8	Pappagallino ondulato	<i>Melopsittacus undulatus</i>	
9	Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	2
<b>Corvidi</b>			
10	Corvo bianconero	<i>Corvus albus</i>	
<b>Sturnidi</b>			
11	Maina comune	<i>Acridotheres tristis</i>	
<b>Estrildidi</b>			
12	Bengalino	<i>Amandava amandava</i>	2
<b>Passeridi</b>			
13	Vescovo dorato	<i>Euplectes afer</i>	3
14	Vescovo rosso	<i>Euplectes orix</i>	

## NOTE

- 1 non si hanno prove della formazione di una popolazione in grado di autosostenersi per mancanza di studi adeguati, ma non se ne esclude la possibilità  
 2 alcune nidificazioni accertate pur senza un insediamento stabile ed in grado di autosostenersi  
 3 l'insediamento di una piccola popolazione (2-3 coppie) avvenuta solo dal 2005 suggerisce cautelativamente l'esclusione di questa specie dalla categoria C

## Risultati

Complessivamente la check-list aggiornata al 2009 comprende 370 specie di cui 344 di origine apparentemente selvatica e osservate almeno una volta a partire dal 1950 (Categoria A), 24 di origine apparentemente selvatica e osservate almeno una volta a partire tra il 1800 ed il 1949

(Categoria B), 2 introdotte dall'uomo o sfuggite dalla cattività - Fagiano comune e Parrocchetto monaco - che hanno formato almeno una popolazione nidificante in grado di autosostenersi (Categoria C). Gli esemplari di Cicogna bianca, Grifone e Piccione selvatico avvistati nella regione appartengono sia a popolazioni apparentemente selvatiche sia introdotte dall'uomo e, pertanto, è stato loro attribuito il doppio codice AC, mentre alla Starna è stato assegnato il doppio codice AE, sebbene questa specie attualmente sia presente solo con esemplari frutto di ripopolamenti a scopo venatorio.

Le specie regolari sono 256, mentre le irregolari sono 25; le specie accidentali sono 65 (di cui solo 8 con più di 10 osservazioni), 22 le accidentali storiche, mentre Pollo sultano e Picchio nero risultano definitivamente estinte.

Le specie nidificanti regolari sono 141, le irregolari 17, le accidentali 15 e 9 le storiche; per la Gallina prataiola non si è certi della sua definitiva estinzione poiché saltuariamente vengono osservati singoli esemplari, mentre per l'Aquila di Bonelli la nidificazione storica è solo supposta.

COSTA (1871) e SCARZIA (1893) annoverano per la fauna salentina, sebbene rara, anche l'Averla meridionale, *Lanius meridionalis*, che si è preferito non inserire quale specie storica nella check-list, in attesa della verifica delle segnalazioni di Averla maggiore anteriori al 1994 e riportate nel precedente lavoro.

Per l'unica osservazione di Fischione americano, già riportata nella precedente check-list, non si è avuta la certezza appartenesse a un esemplare selvatico e, pertanto, è stata inclusa, unica specie, nella Categoria D.

Nella lista della Categoria E sono state incluse 14 specie, di cui per almeno 2 (Parrocchetto dal collare e Bengalino) vi sono segnalazioni di nidificazioni, che non hanno portato, comunque, alla formazione di una popolazione nidificante in grado di autosostenersi per più anni. Inoltre il Vescovo dorato, poiché nidifica nella Riserva delle Cesine con un massimo di 2-3 coppie e solo dal 2005, non è stata ancora considerata specie in grado di autostenersi.

Delle specie presenti nella vecchia check-list, 27 hanno cambiato il nome volgare, 33 quello scientifico e 4 entrambi.

La nuova check-list comprende 18 nuove specie rispetto a quella precedente di MOSCHETTI *et alii* (1996): Ossifraga, Pellicano rossiccio, Airone schistaceo, Pavoncella codabianca, Gabbiano di Sabine, Gabbiano di Franklin, Gabbiano reale pontico, Mugnaiaccio, Sterna di Rüppell, Prispolone indiano, Spioncello marino, Cutrettola testagialla orientale, Tordo oscuro, Tordo golanera, Lui di Pallas, Forapaglie macchiettato, Pigliamosche pettirosso, Fringuello alpino; la segnalazione storica di Ubara africana, *Chlamydotis undulata*, è stata revisionata e

attribuita all'Ubara asiatica (BRICHETTI & FRACASSO, 2004); inoltre la Sterpazzolina è stata separata in due differenti specie in accordo con la nuova check-list italiana.

Dal confronto con la check-list precedente emerge, inoltre, che 111 specie hanno una categoria che denota una maggiore presenza in regione di quanto precedentemente attribuito. Tra queste, di particolare interesse sono le ulteriori segnalazioni appartenenti a:

- 10 specie precedentemente considerate solo storiche, accidentali con meno di 10 osservazioni (Anatra marmorizzata, Moretta codona, Svasso cornuto, Orco marino, Aquila reale, Falaropo beccolargo, Gruccione egiziano, Allodola golagiulla, Zigolo golarossa e Zigolo boschereccio);
- 14 specie accidentali con meno di 10 osservazioni (Cigno selvatico, Oca lombardella minore, Oca collarosso, Pellicano comune, Grifone, Aquila anatraia maggiore, Pavoncella gregaria, Piro piro del Terek, Labbo, Sordone, Culbianco isabellino, Canapino pallido, Bigia di Ruppell, Picchio muraiolo);
- Gazza marina, prima accidentale storica con più di 10 osservazioni;
- Pesciaiola, prima accidentale storica con più di 10 osservazioni, e Svasso collarosso, prima accidentale storica con solo 5 osservazioni, ora entrambi considerati svernanti irregolari;
- 8 specie precedentemente considerate accidentali (Orchetto marino, Airone guardabuoi, Poiana codabianca, Aquila anatraia minore, Falaropo beccosottile, Gabbiano reale nordico, Calandro maggiore e Zigolo delle nevi) e ora incluse in categorie fenologiche indicanti maggiore presenza nella regione.

Le precedenti segnalazioni di Averla maggiore non sono state considerate attribuibili certamente a questa specie in quanto potenzialmente attribuibili anche a *Lanius meridionalis*, attualmente elevata a rango di specie e non più sottospecie della prima, e pertanto sono in attesa di una più corretta valutazione; ciononostante sono state registrate per la prima specie 4 nuove segnalazioni.

Sette specie non sono state più osservate dopo il 1994 (Smergo maggiore, Uccello delle tempeste, Schiribilla grigiata, Piovanello violetto, Colombella, Beccofrusone, Pagliarolo) e pertanto sono state loro attribuite categorie fenologiche denotanti minor presenza se non già considerate accidentali. La Gallina prataiola è stata considerata probabilmente estinta per mancanza totale di osservazioni di esemplari in comportamento riproduttivo, nonostante i progetti di ricerca avviati in questi anni nell'areale originario della specie; il Chiurlottello è stato ritenuto probabilmente estinto, nonostante ne siano stati avvistati 15-17 individui nel 1995 (SERRA *et alii*, 1995), perché in serio rischio di estinzione a livello globale (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008).

Complessivamente 35 specie presentano una categoria fenologica che

denota una minore presenza in regione di quanto attribuito nella check-list di MOSCHETTI *et alii* (1996), mentre per 39 specie si è provveduto solo a un riordinamento dei simboli, volendo dare più o meno importanza a una categoria fenologica; per Fistione turco, Voltolino, Chiurlo piccolo, Piro piro boschereccio e Piro piro piccolo si sono effettuati solo lievi cambiamenti di direzione diversa per le differenti classi fenologiche loro attribuite.

Rispetto alla situazione del 1994 vi sono 5 nuove specie che nidificano regolarmente da quando hanno colonizzato la regione: Cormorano, Marangone minore, Cicogna bianca, Fenicottero, Oca selvatica. Il Fistione turco ha ripreso a nidificarvi, sebbene in maniera irregolare, mentre si è avuta la conferma della nidificazione, non sempre regolare, di 10 specie prima date come dubbie: Gabbiano comune, Beccapesci, Topino, Rondine montana, Codirossone, Lui bianco, Beccafico, Bigia grossa, Magnanina comune, Crociere. Fischione, Codone e Prispolone sono stati considerati nidificanti accidentali per alcune nidificazioni avvenute in regione e sfuggite agli autori della precedente lista. Per il Cuculo dal ciuffo sono state accertate nuove nidificazioni. Viceversa, alcune specie prima riportate come nidificanti sono state ora classificate come nidificanti solo irregolari o accidentali: Marzaiola, Mestolone, Moriglione, Moretta, Capovaccaio, Voltolino, Pernice di mare, Piro piro piccolo, Sterna comune, Canapino comune, Lui verde; anche il Gufo reale è stato considerato nidificante irregolare in quanto non vi sono segnalazioni recenti della sua nidificazione, e ciò probabilmente a causa di scarsa ricerca. Lo Svasso piccolo e il Lucherino da nidificanti irregolari sono stati considerati solo accidentali, non avendo avuto la riconferma della loro nidificazione dopo il 1994. La Pavoncella è stata considerata nidificante estinta, la Gallina prataiola probabilmente estinta, mentre per lo Stiaccino non sono state rinvenute segnalazioni, anche storiche, della sua nidificazione in regione e, pertanto, si ritiene che l'abbinamento della categoria di nidificazione nella precedente check-list sia frutto di un errore.

Per il Regolo, precedentemente riportato come nidificante probabile, non si sono avute informazioni tali da modificarne lo status.

Alle specie inserite nella check-list se ne devono aggiungere due le cui segnalazioni non sono state ancora omologate dal COI - il Codazzurro, *Tarsiger cyanurus*, A1 [LE2006] e il Lui bianco orientale, *Phylloscopus orientalis*, A1 [LE 2005] - oltre al Rampichino alpestre, *Certhia familiaris*, di cui si è venuti a conoscenza di una recente segnalazione senza averne avuto l'autorizzazione all'uso e senza averne potuto accertarne la veridicità.

Alcune aree, anche vaste, della regione risultano non adeguatamente e/o regolarmente indagate, con particolare riferimento al Promontorio del Gargano, al Subappennino Dauno e al Gradino Pedemurgiano, così come si

hanno scarse informazioni soprattutto in merito alla presenza e alla nidificazione di molte specie come, per esempio, Colombella, Picchio dalmatino, Merlo acquaiolo, Codirossone, Canapino comune, Lui bianco, Lui verde, Beccafico, Bigia grossa, Balia dal collare, Picchio muraiolo.

Questo lavoro, quindi, oltre a voler fornire un aggiornamento del quadro conoscitivo dell'avifauna pugliese, vuole essere lo spunto per nuovi approfondimenti su quanto evidenziato e poco indagato.

*Ringraziamenti* - Un doveroso ringraziamento va a tutti gli aderenti al gruppo Argonauti e all'Associazione ORME (recentemente confluiti in "*Sulle ORME degli Argonauti*"), sia a quanti hanno fornito disinteressatamente loro dati inediti indispensabili all'arricchimento di questo lavoro, sia a quelli che non hanno avuto ancora la fortuna di effettuare segnalazioni di rilievo, ma contribuiscono all'arricchimento dell'archivio dell'Associazione. Si vuole, inoltre, ringraziare Nicola Baccetti, Pierandrea Brichetti, Andrea Corso, Enzo Cripezzi, Gino Galasso, Anthony Green, Marco Gustin, Stefano Laurenti, Ugo Mellone, Tonio Sigismondi ed Alberto Sorace che hanno fornito un prezioso aiuto e gli Osservatori Faunistici di Bitetto, Calimera e Brindisi.

#### BIBLIOGRAFIA

- AERC TAC, 2003 - AERC TAC's Taxonomic Recommendations. <http://www.aerc.eu/DOCS/AERCTAC.pdf>
- BELLINI F., CILLO N., GIACOIA V. & GUSTIN M., 2008 - L'avifauna di interesse comunitario delle gravine ioniche - *Oasi LIPU Gravina di Laterza* (TA).
- BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2008 - Critically Endangered birds: a global audit - *BirdLife International*, Cambridge, UK.
- BRICHETTI P., 2005 - Banca Dati Ornitologica 2000. Bibliografia Italiana 1900-2007 - *ARA SPIX Editrice*, Marasino (BS).
- BRICHETTI P. & FRACASSO G., 2003-2010 - Ornitologia italiana. Voll. 1-6 - *Alberto Perdisa Editore*, Bologna.
- BRICHETTI P. & MASSA B., 1998 - Check-List degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997 - *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- COSTA G., 1871 - Fauna Salentina - *Tipografia Editrice Salentina*, Lecce.
- FRACASSO G., BACCETTI N. & SERRA L., 2009 - La lista CISO-COI degli Uccelli italiani - Parte prima: liste A, B e C - *Avocetta*, 34: 5-24.
- FRUGIS S. & FRUGIS D., 1963 - Le paludi pugliesi a sud del Gargano (osservazioni ornitologiche) - *Riv. ital. Orn.*, 33: 79-123.
- LA GIOIA G. (a cura di), 2009 - Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Lecce - *Edizioni del Grifo*, Lecce.
- LA GIOIA G. & SCEBBA S., 2009 - Atlante delle migrazioni in Puglia - *Edizioni Publigratic*, Trepuzzi (LE).
- LAURENTI S. & PACI A.M., 2006 - Checklist degli uccelli dell'Umbria aggiornata al 2006 - *Uccelli d'Italia*, 31: 5-25.
- MOSCHETTI G., SCEBBA S. & SIGISMONDI A., 1996 - Check-List degli uccelli della Puglia - *Alula*, 3: 23-36.
- PAVIA M. & BOANO G., 2009 - Check-list degli uccelli del Piemonte e della Valle d'Aosta aggiornata al dicembre 2008 - *Riv. ital. Orn.*, 79: 23-47.
- SCARZIA G., 1893 - Fauna Salentina. Ornitologia - *Tipografia e Cartoleria Garibaldi*, Lecce.
- SERRA L., BACCETTI N. & ZENATELLO M., 1995 - Slender-billed Curlews wintering in Italy in 1995 - *Birding World*, 8 (8): 295-298.
- SIGISMONDI A., BUX M., CALDARELLA M., GIOIOSA M. & RIZZI V., 2003 - Lista rossa dei vertebrati del Parco Nazionale del Gargano. In: SIGISMONDI A.. Isola Biologica, la fauna del Parco Nazionale del Gargano - *Edizioni del Parco Nazionale del Gargano*.